

Registro ICC-SEC

Análisis de datos basales

07/02/2023

El número de pacientes incluidos durante la primera y segunda fase del registro de pacientes con insuficiencia cardiaca correspondiente a SEC-Excelente es igual a 1716.

Las variables cualitativas se expresan en porcentajes y las variables cuantitativas se presentan como media \pm desviación típica y como mediana (rango intercuartílico).

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES

Tabla 1. Características basales de los pacientes incluidos en el registro ICC-SEC.

	n	%
Pacientes (n)	1716	
Tipo de inclusión		
Hospitalizado	1208	70,40
Ambulatorio	508	29,60
Edad (años)	1704	
Media \pm SD		71,24 \pm 12,56
Mediana (IQR)		74 (63-81)
Hombres	1063/1715	61,98
Raza	1715	
Blanca	1696	98,89
Negra	3	0,17
Otra	16	0,93
Tipo de Unidad de IC		
Comunitaria	225	13,11
Especializada	1132	65,97
Avanzada	359	20,92
Antecedentes		
Insuficiencia cardiaca previa		
NO	676	39,39
FEVI <40%	572	33,33
FEVI 41-49%	154	8,97
FEVI >50%	314	18,30
Seguimiento previo en una unidad de IC	587/1705	34,43
Ingresos por IC en el año previo	565/1710	33,04
Dispositivo electrónico	1710	
No	1305	76,32

	n	%
TRC	28	1,64
DAI	140	8,19
TRC-DAI	107	6,26
MCP convencional	130	7,60
Síndrome coronario agudo	520/1709	30,43
Revascularización coronaria	1713	
No	1177	68,71
Percutánea	414	24,17
Quirúrgica	83	4,85
Ambas	39	2,28
Valvulopatía	651/1704	38,20
Fibrilación auricular	1711	
No	814	47,57
Paroxística	249	14,55
Persistente	162	9,47
Permanente	486	28,40
Comorbilidades		
Insuficiencia renal crónica	682/1704	40,02
Ictus / AIT	167/1702	9,81
EPOC / Asma	290/1706	17,00
SAOS que precisa de CPAP	195/1704	11,44
Demencia	57/1704	3,35
Hemiplejía, paraplejía, incapacidad funcional	46/1703	2,70
Cáncer / linfoma / leucemia activos	110/1704	6,46
Traumatismo o caídas en el último año	70/1703	4,11
Hipertensión arterial	1246/1710	72,87
Diabetes mellitus	747/1706	43,79
Anemia	586/1701	34,45
Ferropenia	570/1685	33,83
Hiponatremia significativa	64/1700	3,76
Desnutrición	76/1699	4,47
Tabaquismo	1712	
No	884	51,64
Activo	243	14,19
Ex	585	34,17
Datos de ingreso/consulta		
Tipo de IC (hospitalizados)	1207	
No novo	598	49,54
Crónica descompensada	609	50,46
Etiología de la IC	1713	

	n	%
Isquémica	541	31,58
Hipertensiva	141	8,23
Valvulopatía	299	17,45
MCD Idiopática	235	13,72
MCD Alcohólica	41	2,39
Arritmia	211	12,32
Otras	245	14,30
Clase funcional	1700	
I	119	7,00
II	546	32,12
III	781	45,94
IV	254	14,94
Anchura del QRS	1522	
Media \pm SD		117,97 \pm 29,96
Mediana (IQR)		110 (98-140)
BRI	402/1692	23,76
FEVI (%)	1646	
Media \pm SD		40,79 \pm 15,82
Mediana (IQR)		39 (29-55)
Categorías FEVI	1646	
FEVI reducida (FEVI \leq 40%)	913	55,47
FEVI ligeramente reducida (FEVI 41-49%)	196	11,91
FEVI preservada (FEVI \geq 50%)	537	32,62
Peso (kg)	1481	
Media \pm SD		77,47 \pm 18,34
Mediana (IQR)		75 (65-86)
Talla (m)	1373	
Media \pm SD		1,66 \pm 0,10
Mediana (IQR)		1,7 (1,6-1,7)
IMC (kg/m ²)	1360	
Media \pm SD		28,22 \pm 6,08
Mediana (IQR)		27,1 (24,3-30,9)
Frecuencia cardíaca	1588	
Media \pm SD		72,52 \pm 13,44
Mediana (IQR)		70 (63-80)
Presión arterial sistólica	1590	
Media \pm SD		116,74 \pm 19,24
Mediana (IQR)		115 (102-128)
Hemoglobina	1602	
Media \pm SD		13,03 \pm 2,22
Mediana (IQR)		13,1 (11,5-14,6)
Sodio sérico	1627	
Media \pm SD		138,94 \pm 3,56
Mediana (IQR)		139 (137-141)
Potasio	1535	

	n	%
Media \pm SD		4,30 \pm 0,57
Mediana (IQR)		4,3 (3,9-4,7)
Filtrado glomerular (FG) (ml/min)	1567	
Media \pm SD		59,49 \pm 23,36
Mediana (IQR)		59 (41-78)
FG < 30 ml/min	174/1567	11,10
NT-proBNP	1292	
Media \pm SD		4239,98 \pm 6886,08
Mediana (IQR)		2025 (921-4480)
Ritmo actual	1674	
Sinusal	1019	60,87
FA / flutter	655	39,13
Tratamiento		
IECA	1681	
SI IECA	360	21,42
<i>Titulación de dosis</i>	360	
Sí, pero aún en titulación	183	50,83
Sí, en dosis máxima recomendada	59	16,39
Sí, en dosis máxima tolerada	118	32,78
NO IECA	1321	78,58
<i>Motivo</i>	1320	
No, por falta de indicación	434	32,88
No, por intolerancia / contraindicación	231	17,50
No, por otros motivos	655	49,62
ARA II	1680	
SI ARA II	256	15,24
<i>Titulación de dosis</i>	254	
Sí, pero aún en titulación	106	41,73
Sí, en dosis máxima recomendada	61	24,02
Sí, en dosis máxima tolerada	87	34,25
NO ARA II	1424	84,76
<i>Motivo</i>	1419	
No, por falta de indicación	552	38,90
No, por intolerancia / contraindicación	231	16,28
No, por otros motivos	636	44,82
IECA o ARA II	615/1680	36,61
Sacubitril/Valsartán	1681	
SI Sacubitril/Valsartán	639	38,01
<i>Titulación de dosis</i>	638	
Sí, pero aún en titulación	329	51,57
Sí, en dosis máxima recomendada	116	18,18

	n	%
Sí, en dosis máxima tolerada	193	30,25
NO Sacubitril/Valsartán	1042	61,99
<i>Motivo</i>	1041	
No, por falta de indicación	562	53,99
No, por intolerancia / contraindicación	162	15,56
No, por otros motivos	317	30,45
ARM	1681	
SI ARM	952	56,63
<i>Titulación de dosis</i>	945	
Sí, pero aún en titulación	400	42,33
Sí, en dosis máxima recomendada	251	26,56
Sí, en dosis máxima tolerada	294	31,11
NO ARM	729	43,37
<i>Motivo</i>	724	
No, por falta de indicación	402	55,52
No, por intolerancia / contraindicación	153	21,13
No, por otros motivos	169	23,34
Betabloqueantes	1677	
SI Betabloqueantes	1342	80,02
<i>Titulación de dosis</i>	1337	
Sí, pero aún en titulación	598	44,73
Sí, en dosis máxima recomendada	223	16,68
Sí, en dosis máxima tolerada	516	38,59
NO Betabloqueantes	335	19,98
<i>Motivo</i>	331	
No, por falta de indicación	153	46,22
No, por intolerancia / contraindicación	104	31,42
No, por otros motivos	74	22,36
Diuréticos	1426/1679	84,93
Digoxina	138/1672	8,25
Ivabradina	152/1673	9,09
Antiagregantes	551/1672	32,95
Anticoagulantes	1677	
No	710	42,34
Anticoagulantes orales directos	667	39,77
Anti VitK	300	17,89
Inhibidores SGLT2	672/1674	40,14
Quelantes del potasio	31/1671	1,86

	n	%
Plan de seguimiento establecido con equipo multidisciplinar, incluyendo enfermería y AP	1275/1666	76,53
Seguimiento en una unidad de IC	1174/1675	70,09
Programa de rehabilitación cardiaca	159/1660	9,58

Patrocinio no condicionado de Laboratorios Farmacéuticos Rovi:

